


# Алкогольное поражение печени

**АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ (АБП)** – структурное перерождение и нарушение функции печени. Заболевание развивается из-за бесконтрольного употребления алкоголя. Этил, содержащийся в спирте, попадает в желудок и печень, где расщепляется и выводится из организма естественным путем. Но если алкоголь употребляется регулярно, организм не успевает справляться с его переработкой и выведением, и в печени скапливаются токсические вещества, вызывая заболевание.



## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АБП:

- длительное потребление алкоголя в больших дозах (80 г чистого этилового спирта ежедневно в течение 10 лет) – фактор риска цирроза печени (25 мл водки эквивалентны 10 г этилового спирта, 100 мл вина эквивалентны 10 г этилового спирта, 200 мл пива эквивалентны 10 г этилового спирта);
- генетическая предрасположенность;
- болезни печени, перенесённые или действующие (гепатиты В и С).



## ОСТРАЯ ФОРМА АБП ИМЕЕТ ДВЕ СТАДИИ

**Первая стадия** заболевания протекает бессимптомно. Но у некоторых больных можно наблюдать боли в правом подреберье, сниженный аппетит, тошноту, возможно проявление желтухи.

**Вторая стадия** начинается остро и быстро, чаще заканчивается смертью. На этой стадии можно наблюдать такую симптоматику – тупая боль с правой стороны, тошнота и рвота, диарея, потеря аппетита, слабость.

**Хроническая форма** протекает долго и с осложнениями. Регулярно появляются такие симптомы как:

- умеренная боль в правом подреберье;
- отрыжка;
- тошнота;
- запоры и диарея.

Очень редко возможно проявление желтухи. Когда болезнь начинает прогрессировать, развивается цирроз печени со свойственной для него симптоматикой:

- покраснение ладоней;
- сосудистые звёздочки;
- изменение консистенции ногтей;
- гинекомастия.

Чем сильнее развился цирроз, тем больше симптомов можно наблюдать. Именно поэтому важно вовремя диагностировать недуг и начать его лечение.

## СТАДИИ АБП – стеатоз, алкогольный гепатит, цирроз.

**Стеатоз печени** – это первая стадия – алкогольная жировая болезнь печени. Она развивается практически у всех людей, чрезмерно употребляющих алкоголь. Если бросить пить, то в течение нескольких недель состояние нормализуется без вмешательства врачей.

**Алкогольный гепатит** – на этой стадии развивается подострое воспаление печени. Болезнь сопровождается нарушением работы печени, а в конечном счете развивается цирроз. Очень часто возникают осложнения, такие как кровотечения из варикозно расширенных вен. Это симптом того, что болезнь прогрессирует, и требуется немедленно заняться её лечением.

**Цирроз печени** – последняя стадия заболевания, которая развивается очень часто у алкоголизированных людей. Сопровождается массивными фиброзами, нарушениями основных функций печени. Приводит к развитию портальной гипертензии. Значительно повышается риск развития прочих заболеваний, к примеру, гепатоцеллюлярной карциномы (печеночноклеточный рак). Как следствие, это приводит к летальному исходу.

## ЛЕЧЕНИЕ АБП

Если выявлена АБП, лечение на ранней стадии может предотвратить её развитие и даже восстановить полноценную работоспособность органа. При переходе болезни на другие стадии лечение заключается в купировании симптомов и предотвращении прогрессирования заболевания. Самый важный фактор при лечении, ускоряющий весь процесс и гарантирующий полное выздоровление, – полный отказ от употребления алкоголя. К тому же это заметно улучшит общее состояние человека и избавит его от алкогольной болезни печени ранней стадии.

## ОСЛОЖНЕНИЯ АБП:

- печеночная энцефалопатия;
- кровотечения в ЖКТ;
- почечная недостаточность;
- рак печени.

## ПРОФИЛАКТИКА АБП

Главное правило профилактики – избегать употребления спиртных напитков. Даже если печень уже повреждена, отказ от алкоголя нормализует её состояние. Не стоит забывать, что от алкогольной болезни печени большинство пациентов умирает в течение 5 лет. Поэтому профилактические меры крайне важны.

#**ТЫ  
СИЛЬНЕЕ,  
КОГДА МЫСЛИШЬ  
ТРЕЗВО**

# ПОМНИ! БЕЗОБИДНЫХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!